

Darzalex

INFORMACIJA ZA OBOLJELE OD MULTIPLOG MIJELOMA

DARZALEX se daje u obliku infuzije (ukapavanjem) u venu, te injekcijom pod kožu (subkutana injekcija) u područje trbuha, ovisno o indikaciji:

- u kombinaciji s lenalidomidom i deksametazonom, ili
- u kombinaciji s bortezomibom i deksametazonom.

Osim infuzije, Darzalex je odsada dostupan i u novoj formulaciji – kao otopina za supkutanu injekciju u dozi od 1800mg. Jedna bočica s 15ml otopine za injekciju sadrži 1800mg daratumumaba (120mg daratumumaba po ml).

Kako se primjenjuje supkutana injekcija?

DARZALEX će Vam dati liječnik ili medicinska sestra injekcijom pod kožu (supkutanom injekcijom) tijekom približno 3 - 5 minuta. Lijek se primjenjuje u područje trbuha (abdomena) i ne smije se primijeniti u druge dijelove tijela, kao ni u dijelove trbuha na kojima je koža crvena, prekrivena modricama, osjetljiva na dodir, tvrda ili prekrivena ožiljcima.

DARZALEX se može primjenjivati sam ili zajedno s drugim lijekovima koji se koriste za liječenje multiplog mijeloma.

Kada se primjenjuje sam, DARZALEX se primjenjuje na sljedeći način:

- jedanput na tjedan tijekom prvih 8 tjedana, zatim
- jedanput svaka 2 tjedna tijekom 16 tjedana, i nakon toga
- jedanput svaka 4 tjedna toliko dugo dok se Vaše stanje ne pogorša.

Kada se DARZALEX primjenjuje zajedno s drugim lijekovima liječnik Vam može promijeniti vremenski razmak između doza, kao i broj doza koje ćete primiti.

Više o lijeku i nuspojavama možete pročitati ovdje:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_hr.pdf